

2022. No1  
(6/8 ~ 7/5) 30日間

73才

2021年5月29日 1回目7ヶ月上投種 (ファイザー)

6月19日 2回目7ヶ月上投種 (ファイザー)

2022年6月20日(月) 7ヶ月上後遺症と診断

はじめの症状

2022年6月6日(日) PM 8:00頃

左下半身(左腰、左太もも、左足くるぶし)に激痛。

立たない、歩けない、動けない、寝れない → 約7日間。

6月21日(火)に左足裏のしびれが"2"に。足

6月22日(水) 1パル×7ヶ上 12mg×1 朝食後 服用

6月23日(木) 1パル×7ヶ上 12mg×1 朝食後 服用

6/23 ~ 6/29 服用する前と症状は変化なし。

6月30日(金) 少し激痛が"楽"になってきた。

7月2日(土) 1パル×7ヶ上 12mg×1 朝食後 服用

7月3日(日) 1パル×7ヶ上 12mg×1 朝食後 服用

7月5日(火) (6/6に はじめの症状があった1ヶ月)

① 体が"少し"軽くなった。

② 少し歩ける様になった。

N02  
( $\frac{1}{6}$  ~  $\frac{1}{2}$ )  $\frac{1}{6}$ (自由)

- 7月7日(木) 椅子に10分位 座わりの様になった。  
7月8日(金) ①便座にすわりの様になった。(4~5分)  
②腰を曲げわりの様になった。  
床におちているものを 取わりの様になった。  
7月9日(土) 洗面所<sup>2</sup>で顔を洗った。(1/6以来はじめて)

毎日少しづつ不自由な、ヒソカに良くなってきた。  
毎日家の中で歩く練習をしていく。

7月13日(水) 120m 先にお子散髪屋に歩いていった。  
(外出への挑戦)

7月15日(金) 家内と耳鼻科に行き、スリッパを買物をして  
帰ってきた。(私生活の再開的<sup>2</sup>な一歩だ。)   
外出時には歩けるので、10分位です。

7月16日(土) 11W X 14L 12MP X 1 昼食後服用

7月17日(日) 左腰、左ふとももの痛みが 次第になかった。  
(左足裏のしびれは、あり)

7月18日(日) 朝から左腰 左お尻が痛みはじめた。  
しかし左ふとももと 左ふくらみ<sup>2</sup>の痛みは、ほろ  
ろなくなった。

7月20日(火) 左ふともも、左ふくらみ<sup>2</sup>の痛みが、なくなった。

No 3  
(7/2 ~ 8/6) 16P(日)

7月22日(金) イバロ×7片 12mg×1 昼食後服用

7月23日(土) イバロ×7片 12mg×1 //

7月28日(木) 家内が"私の歩き方が おすく"に歩いていると言った。歩行が"楽"になった。  
歩けるのは、10分位です。

7月29日(金) イバロ×7片 12mg×1 昼食後服用

7月30日(土) イバロ×7片 12mg×1 //

7月29日(金) 午後から 左腰、左お尻の深い部分の痛みが"少し楽"になった。非常に大きく前進です。

7月30日(土) 朝から 口も体の"軽い。午後から少し痛みが"なくなった。

7月31日(日) ~ 8月6日(土)

1週間 持て症ホト、大きな変化なし。  
少しづつ、左腰 左お尻の痛みが"楽"になった。悪化可子とほひい。  
激痛も少なくなかった。ただ"左足裏の  
違和感"が とれたい。

8月5日(金) イバロ×7片 12mg×1 昼食後服用

8月6日(土) イバロ×7片 12mg×1 //

・(6月6日 = 激痛が動けなくなつた、2ヶ月目です。)  
から

104  
(8/7~8/14) 8日(日)

8月7日(日) ~ 8月9日(火)

午前中は、左腰、左お尻の痛みが、少なくなりました。  
(左足裏のしびれはあり続.) 午後の下半身痛みが  
ささくささく、体を横にし211です。毎日、15時頃  
収まり状態です。

8月10日(水)。6日6日に激痛が重くたつて以来  
はじめて、一日中体を横にする=つじこ過=可  
=しか"で"てました。11"きの回復"です。

8月12日(金) 11"10"X742 12MPX1 昼食後 服用

8月13日(土) 11"10"X742 12MPX1 "

8月10日(水) ~ 14日(日) 8月10日以来 左腰、左お尻の  
痛みが、体を横にする=しは、なくなつた。(痛みは、  
少しあります)。 左足裏のしびれが強く  
残つています。

以上です。

まとめ

① バルビタールを服用して感じた事  
 (6/20 ~ 8/14までの服用回数 / 3回)  
 この薬剤の品のバルビタールが可。

- バルビタールを服用した夜、又は翌日は体がとてもあたたかくなり軽くなります。
- 稀の場合 即ち効果が2日というより3日、4日程度から効果が2日と見受けられる。今よりも悪くなることは、ありません。激痛も少なくなり週に1~2回程度です。
- 特に 1/2 1/3 1/6 8/5 8/6 の服用後はびっくりするほど回復しました。
- 今後とも服用の続きをしたいと思います。

② 8月14日(日)現在の状態 → 歩行困難

(6/6に「私の」の症状が2日、7日、  
 6/20に「799」後遺症と診断をうけ2、5、6日)

- 歩行困難。外出時の歩行は10分が限界。  
 痛み。時には激痛あり。左足裏のしびれは一時あり。
- 椅子に座られるのは10分位。階段は平すりがないと上れません。
- 右足に痛みがないので車の運転はできます。

(2022/8/14) W/A 上