

セミナーに参加し実際介護の記録も郵送しますと、
お伝えさせて頂きました。遅くなりまして申し訳ありません。会の主旨に賛成

2015/09/30

認知症セミナーin尼崎 アンケート用紙

ケアネット尼崎では、今後もこのような講演会を開催していきたいと考えております。今後の運営の参考とさせていただきますので、アンケートにご協力をお願いいたします。回答に○をつけてください。

- ① 本日のセミナーはいかがでしたか？
 大変満足 ・ 満足 ・ 普通 ・ 良くなかった

② 感想をご自由にお書きください。

意味性認知症の母を介護しています。

- ③ あなたやあなたの家族が抗認知症薬を服用し、増量したことによって、興奮や暴力、 歩行障害、嚥下障害などが起こったことがありますか？（例 アリセプト 3mg→5mg→10mg）

ない ・ 少しある ・ ある（その場合、どの薬でしたか。○をつけてください。）

別紙参照願います アリセプト、イクセロンパッチ、レミニール、 メマリ
↑ 恐くて、飲めなかった。

- ④ 問い③で「ある」、「少しある」とお答えした方にお聞きします。
 そのように介護負担が増大したことで、薬を減量または中止することになりましたか？

減量または中止した ・ 増量したまま変わらなかった

- ⑤ 国が定めた抗認知症薬の増量規定について、どのようにお考えか、ご自由に裏面にお書きください。⇒

- ⑥ 問い③～⑤につきましては、『一般社団法人抗認知症薬の適量処方を実現する会』にて個人情報をご省略集計処理されたのち、市民向けに情報開示されます。差支えない範囲で下欄にご記入ください。なお、長尾クリニックから今後の催しや医療・介護情報等をメールマガジンにてご案内いたしますので、ご希望の方はメールアドレスをご記入ください（パソコンのアドレスをお持ちの方はそちらをお書きください）。

増量にして、しばらくして副作用が出ました。

それ以来、医師、病院に不信感かつのり

薬

その病院へ行かず、少しの薬さえも、使うことが

恐くなりました。少量なら、もう少し、穏やかに生活
できたと思います。

副作用は、とても、わかつらい時もあるので、もっと、
薬を、処方する時に、詳細に教えて欲しいから、
個人差があるから、で、終わらせて、ないで欲しい。

~~とき~~ 薬の副作用の不安が、続き、少しの薬の
使用も、介護家族が、認知症の人に、~~な~~

りにスタッチを、貼ることに、これを貼って、また
副作用が出ると思うと、~~な~~ 自分が、加害者に
なると、~~な~~ 恐怖感がありました。

国の、~~国~~ 増量規定に、強く、反対します。
強い副作用が、出て、生活が、低下する。副作用が、出て、
あつ前に、医師は、思わなくて、欲しい。医師への、信頼が、
なくなった。

2015.2.25

薬剤の過剰性。レビ-小体性認知症

日付	起因	投薬名/量
2004	医院(みかげ) 甲状腺機能低下症	チラーザン
2011.2.25 (平成23年) 67才	医院(巽北) 高血圧の 健康検査にて血圧の数値が高いと言われ。 検査値不明 → 前後の記録を 63才 平成18年 血圧上. 139. 下89 66才 21 130. 70. → 押高い診断 69才 24 160. 80.	高血圧の薬 Micardis 40mg (ビカルディス) 1日1回
体重		
同年 3.23.	初めての漢方薬 これまでの事相談して。甲状腺のお薬で。量がコントロールできていなければ。	
同年 4月	初めての認知症の通院 警察病院	プリセプト 3mg スタート
約10月	一人で祖母の老人ホーム行き(河内長野) 一人で料理して。台コンロで 作ったごはん	効果出る 約10月で副作用
6.11	プリセプト 副作用	お腹の調子が悪い。 赤通じは毎日。便は黒い
7.7	Xマリー 初処方	Xマリー ② mg
8.12	Xマリー 増量 料理。洗たく。買物 一人でできるの 調子よい。	Xマリー 20mg 効果あり 科
8.19.	Xマリー 副作用	頭フラフラ。二日間寝ている 日中 ずうと。一日中。
2013.10月	デイ 介護士さんより高血圧指摘頂く。 デイ 生活習慣見直す。医師に診断のPTX投 い50才 上 160. 下 95. たずく 上. 140. 160. 200. 下 70~90 170. 100	
現在	上 140 下	